



واکسین تیتانوس و دیفتری (تی دی) و آنچه باید بدانید



1. راجع به این بیماریها :

* تیتانوس و دیفتری بیماریهایی خطرناک هستند.

* عامل تیتانوس از طریق زخم و یا خراشیدگی روی جلد وارد بدن میشود .

* دیفتری از شخص مصاب به دیگران از طریق بینی و یا دهن منتقل می شود .

عوارض تیتانوس:

* گرفتگی و درد شدید عضلات .

* مشکلات تنفسی .

عوارض شدید بعدی تیتانوس:

* بسته ماندن دهن که در نتیجه بیمار نمی تواند چیزی بخورد.

* مرگ .

عوارض دیفتری :

* به وجود آمدن یک پوشش ضخیم داخل بینی بلعوم و سیستم تنفسی .

عوارض شدید بعدی دیفتری:

* مشکلات تنفسی .

* نارسائی قلبی .

* فلج .

* مرگ .

2. راجع به واکسین :

واکسیناسیون بهترین راه برای پیشگیری از تیتانوس و دیفتری می باشد.

3. چه کسی باید از واکسین Td استفاده کند و چه وقت؟

* Td برای افراد 7 ساله به بالا ساخته شده است .

* افرادی که قبلا حد اقل سه مرتبه برای دیفتری و تیتانوس واکسین نشده اند (توسط واکسین DTP, DTaP, و یا DT) باید توسط Td / واکسین شوند. بعد از تطبیق این واکسین هر 10 سال باید تکرار شود.

این واکسین میتواند همزمان با واکسین های دیگر تطبیق شود.

4. بعضی از اشخاص نباید واکسین Td را بگیرند یا باید که صبر کنند:

* اگر شما تا به حال عکس العمل شدید الی یک یا مشکل دیگری با این واکسین یا واکسین های DTP, DTaP, و یا TD داشته اید .

* اگر شما فعلا کدام بیماری متوسط یا شدیدتر دارید .

* اگر شما حامله دار هستید.

5. خطرات واکسین Td چیست ؟

یک واکسین مانند هر داروی دیگر می تواند احتمالا به عوارض شدید از قبیل حساسیت های شدید الی یک منجر شود.

خطر واکسین Td که منجر به تکلیف شدید یا مرگ شود بسیار کم است

تطبیق واکسین Td بسیار بی خطرتر از مصاب شدن به خود بیماریست .

بیشتر افرادی که این واکسین را تطبیق میکنند هیچ مشکلی با آن ندارند.

عوارض خفیف:

- * درد سرخی و پندیدگی در محل زرق .
این عوارض در بزرگسالان ممکن است شدیدتر باشند .
- * این عوارض ممکن است در طول چند ساعت و یا حتی یک یا دو روز بعد از تطبیق واکسین بروز کنند. و ممکن است بین یک تا دو روز ادامه پیدا کنند .
عوارض شدید (بسیار کم) :

- * عکس العمل های شدید الر یکی بعد از چند دقیقه تا چند ساعت در ناحیه زرق (بسیار به ندرت).
- * درد شدید عضلات در بازو یا بازوها. این عارضه 2 روز تا چند هفته بعد از تطبیق واکسین بروز می کند و ممکنست تا ماهها به طول انجامد.

6. در صورت بروز عکس العمل متوسط یا شدید چه باید کرد ؟

متوجه چه چیزی باید بود ؟

- * هر گونه حالت غیر عادی از قبیل حساسیت شدید تب بالا یا رفتار غیر عادی. عکس العمل شدید الر یک بسیار نادر است. و اگر رخ دهد می تواند چند دقیقه تا چند ساعت بعد از تطبیق بروز میکند . نشانه های حساسیت می تواند شامل نفس تنگی , گرفتگی صدا , خشخش سینه , حساسیت جلدی, رنگ پریدگی, ضعف , ضربان شدید قلب یا سر گیجی باشد .

چه باید کرد ؟

- * با داکتر تماس بگیرید یا فوراً شخص را به داکتر برسانید .
- * به داکتر خود اطلاع بدهید که چه پیش آمده در چه زمان رخ داده و واکسیناسیون چه وقت بوده است .

7. چگونه می توانید بیشتر بدانید؟

- * از داکتر یا نرس خود راجع به این واکسین پرسید آنها می توانند مجموعه اطلاعات و فورمه های چاپی مربوطه را به شما بدهند و یا منابع معلوماتی دیگری را معرفی کنند.
- * با مراکز کنترل و جلوگیری بیماری (CDC) مراجعه کنید: به ویبسایت www.cdc.gov/nip